


国家市场监督管理总局
国产保健食品注册证书

产品名称	合辉牌姜黄余甘子诃子粉		
注册人	北京世纪合辉医药科技股份有限公司		
注册人地址	北京市西城区平原里21号楼7层B808		
审批结论	经审核，该产品符合《中华人民共和国食品安全法》和《保健食品注册与备案管理办法》的规定，现予批准注册。		
注册号	国食健注G20230613	有效期至	2028年11月13日
附件	附1 产品说明书、附2 产品技术要求		
备注			



附1

国家市场监督管理总局
保健食品产品说明书

国食健注G20230613

合辉牌姜黄余甘子诃子粉

【原料】姜黄提取物、余甘子提取物、诃子提取物、橄榄提取物

【辅料】葡萄糖

【标志性成分及含量】每100g含: 姜黄素 1.6g、多酚 4.8g

【适宜人群】有化学性肝损伤危险者

【不适宜人群】少年儿童、孕妇、乳母

【保健功能】本品经动物实验评价, 具有对化学性肝损伤有辅助保护作用

【食用量及食用方法】每日1次, 每次1袋, 冲服

【规格】3g/袋

【贮藏方法】密闭, 置阴凉干燥处

【保质期】24个月

【注意事项】本品不能代替药物; 适宜人群外的人群不推荐食用本产品

No. 24003385

国家市场监督管理总局
保健食品产品技术要求

国食健注G20230613

合辉牌姜黄余甘子诃子粉

【原料】 姜黄提取物、余甘子提取物、诃子提取物、橄榄提取物

【辅料】 葡萄糖

【生产工艺】 本品经粉碎、过筛、混合、分装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】 复合膜应符合YBB00132002的规定。

【感官要求】 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	棕黄色
滋味、气味	具本品应有的滋味、气味，无异味
性状	干燥、均匀粉末
杂质	无正常视力可见外来异物

【鉴别】 无

【理化指标】 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
灰分，%	≤6	GB 5009.4
铅（以Pb计），mg/kg	≤2.0	GB 5009.12
总砷（以As计），mg/kg	≤1.0	GB 5009.11
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.3	GB 5009.17
六六六，mg/kg	≤0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤0.2	GB/T 5009.19

No. 24003386

【微生物指标】 应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数, CFU/g	≤ 30000	GB 4789.2
大肠菌群, MPN/g	≤ 0.92	GB 4789.3 “MPN计数法”
霉菌和酵母, CFU/g	≤ 50	GB 4789.15
金黄色葡萄球菌	$\leq 0/25g$	GB 4789.10
沙门氏菌	$\leq 0/25g$	GB 4789.4

【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。

表4 标志性成分含量测定

项 目	指 标	检测方法
姜黄素 (以 $C_{21}H_{20}O_6$ 计), g/100g	≥ 1.6	《中华人民共和国药典》中“姜黄”项下“含量测定”规定的方法
多酚, g/100g	≥ 4.8	GB/T 8313

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】 净含量为3g/袋, 允许负偏差为9%。

【原辅料质量要求】

1. 姜黄提取物

项 目	指 标
来源	姜黄
制法	经粉碎、提取(10倍量80%乙醇60℃提取3次, 每次2h)、过滤、浓缩、喷雾干燥(进风温度170-180℃, 出风温度70-80℃)、过筛、包装等主要工艺制成
提取率, %	约15
感官要求	桔黄色至黄色粉末
粒度, 目	80
姜黄素, %	≥ 10
干燥失重, %	≤ 5
灰分, %	≤ 5
铅(以Pb计), mg/kg	≤ 2.0
总砷(以As计), mg/kg	≤ 1.0
总汞(以Hg计), mg/kg	≤ 0.3
六六六, mg/kg	≤ 0.2
滴滴涕, mg/kg	≤ 0.2
菌落总数, CFU/g	≤ 30000
大肠菌群, MPN/g	≤ 0.92
霉菌和酵母, CFU/g	≤ 50

No. 24003387

金黄色葡萄球菌	≤0/25g
沙门氏菌	≤0/25g

2. 余甘子提取物

项 目	指 标
来源	余甘子
制法	经粉碎、提取（20倍量纯化水80℃提取3次，每次1.5h）、过滤、浓缩、喷雾干燥（进风温度110-120℃，出风温度50-60℃）、过筛、包装等主要工艺制成
提取率，%	约20
感官要求	棕黄色至棕色粉末
粒度，目	80
多酚，%	≥10
干燥失重，%	≤5
灰分，%	≤5
铅（以Pb计），mg/kg	≤2.0
总砷（以As计），mg/kg	≤1.0
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.3
六六六，mg/kg	≤0.2
滴滴涕，mg/kg	≤0.2
菌落总数，CFU/g	≤30000
大肠菌群，MPN/g	≤0.92
霉菌和酵母，CFU/g	≤50
金黄色葡萄球菌	≤0/25g
沙门氏菌	≤0/25g

3. 诃子提取物

项 目	指 标
来源	诃子
制法	粉碎、提取（20倍量纯化水80℃提取3次，每次1h）、过滤、浓缩、喷雾干燥（进风温度110-120℃，出风温度50-60℃）、过筛、包装等主要工艺制成
提取率，%	约20
感官要求	棕黄色至棕色粉末
粒度，目	80
多酚，%	≥10
干燥失重，%	≤5
灰分，%	≤5
铅（以Pb计），mg/kg	≤2.0
总砷（以As计），mg/kg	≤1.0
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.3
六六六，mg/kg	≤0.2
滴滴涕，mg/kg	≤0.2
菌落总数，CFU/g	≤30000
大肠菌群，MPN/g	≤0.92
霉菌和酵母，CFU/g	≤50
金黄色葡萄球菌	≤0/25g
沙门氏菌	≤0/25g

4. 橄榄提取物

项 目	指 标
来源	橄榄
制法	经粉碎、提取（25倍量50%乙醇60℃提取2次，每次2h）、过滤、浓缩、喷雾干燥（进风温度110-120℃，出风温度50-60℃）、过筛、包装等主要工艺制成
提取率，%	约20
感官要求	棕黄色至深棕色粉末
粒度，目	80
多酚，%	≥10
干燥失重，%	≤5
灰分，%	≤5
铅（以Pb计），mg/kg	≤2.0
总砷（以As计），mg/kg	≤1.0
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.3
六六六，mg/kg	≤0.2
滴滴涕，mg/kg	≤0.2
菌落总数，CFU/g	≤30000
大肠菌群，MPN/g	≤0.92
霉菌和酵母，CFU/g	≤50
金黄色葡萄球菌	≤0/25g
沙门氏菌	≤0/25g

5. 葡萄糖：应符合《中华人民共和国药典》的规定。