国家市场监督管理总局国产保健食品
注册证书

产品名称	纤道夫®小麦麸膳食纤维低聚果糖粉		
注册人	珠海永科制药有限公司,珠海市永科医药科技有限公司		
注册人地址	珠海市联港工业区双林片区创业北路9号,珠海市金湾区联港工业区双林片区创业北路9号南门卫		
审批结论	经审核,该产品符合《中华人民共和国食品安全法》和《保健食品注册与备案管理办法》的规定,现予批准注册。		
注册号	国食健注G 20141267	有效期至	2026年12月19日
附件	附1 产品说明书、附2 产品技术要求		
备注	2024年02月07日,批准该产品名称“纤膳青®小麦麸膳食纤维低聚果糖粉”变更为“纤道夫®小麦麸膳食纤维低聚果糖粉”。

国家市场监督管理总局
保健食品产品说明书

国食健注G 20141267

纤道夫®小麦麸膳食纤维低聚果糖粉

【原料】小麦麸膳食纤维、低聚果糖

【辅料】羧甲基纤维素钠、麦香香精（麦芽酚、丁酸异戊酯、丁酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯）、阿斯巴甜（含苯丙氨酸）

【标志性成分及含量】每100g含：不溶性膳食纤维 38g、低聚果糖 16g

【适宜人群】便秘者

【不适宜人群】婴幼儿、孕妇、乳母、严重器质病变引起的排便困难者

【保健功能】有助于润肠通便

【食用量及食用方法】每日2次，每次1袋，用100m L左右开水冲服，服完后再补充100m L以上的液体

【规格】4.5g/袋

【贮藏方法】密封、置避光干燥处

【保质期】24个月

【注意事项】本品不能代替药物；适宜人群外的人群不推荐食用本产品；服用本品期间建议喝足量水；苯丙酮尿症患者慎用

国家市场监督管理总局
保健食品产品技术要求

国食健注G 20141267

纤道夫[®]小麦麸膳食纤维低聚果糖粉

【原料】小麦麸膳食纤维、低聚果糖

【辅料】羧甲基纤维素钠、麦香香精（麦芽酚、丁酸异戊酯、丁酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯）、阿斯巴甜（含苯丙氨酸）

【生产工艺】本品经粉碎、过筛、混合、分装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】复合膜应符合GB/T 21302的规定。

【感官要求】应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	黄褐色
滋味、气味	微甜，具小麦麸香气味
状态	粉末，无结块，无劣变，无肉眼可见的外来杂质

【鉴别】无

【理化指标】应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
铅（以Pb计），mg/kg	≤2.0	GB 5009.12
总砷（以As计），mg/kg	≤1.0	GB 5009.11
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.3	GB 5009.17
水分，g/100g	≤6.0	GB 5009.3
灰分，g/100g	≤6.0	GB 5009.4

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数，CFU/g	≤30000	GB 4789.2
大肠菌群，MPN/g	≤0.92	GB 4789.3 MPN计数法
霉菌和酵母，CFU/g	≤50	GB 4789.15
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789.10
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789.4

【标志性成分指标】应符合表4的规定。

表4 标志性成分指标

项 目	指 标/td>	检测方法
不溶性膳食纤维，g/100g	≥38	GB 5009.88
低聚果糖，g/100g	≥16	1 低聚果糖的测定

1 低聚果糖的测定

1.1 原理：试样除去蛋白后，离心、脱色，用液相色谱分析，用NH₂柱分离，示差检测器测定，外标法定量。

1.2 试剂

除特殊说明，所用试剂均为分析纯。实验用水为去离子水或同等纯度的蒸馏水。

1.2.1 乙腈：色谱纯。

1.2.2 无水乙醇。

1.2.3 低聚果糖[总含量≥96%，其中蔗果三糖（GF₂）38%，蔗果四糖（GF₃）51%，蔗果五糖（GF₄）7%]。

1.2.4 低聚果糖标准溶液：精密称取含GF₂38%、GF₃51%、GF₄7%的低聚果糖标准品0.0500g，用水溶解并定容至250mL。将此液逐级稀释成下列浓度：

标准溶液名称	GF ₂ (mg/mL)	GF ₃ (mg/mL)	GF ₄ (mg/mL)
1	1.50	2.00	0.30
2	3.00	4.00	0.60
3	4.50	6.00	0.90
4	6.00	8.00	1.20
5	7.50	10.00	1.40

将各标准系列注入高效液相色谱仪进行测定，绘制标准工作曲线。

1.3 仪器

1.3.1 高效液相色谱仪（附带示差检测器）。

1.3.2 离心机。

1.3.3 分析天平：1/10000。

1.3.4 分析天平：1/1000。

1.4 分析步骤

1.4.1 试样制备：称取1.000g试样，放入200mL烧杯中，加水15.0mL溶解，再加45.0mL无水乙醇，搅匀，放置5min，离心，取上清液30.0mL在沸水浴上挥发近干，残液用水溶解并定容至10mL，溶液过0.45μm滤膜，滤液用于HPLC测定。

1.4.2 高效液相色谱参考条件

1.4.2.1 色谱柱：不锈钢柱，内径4.6mm×300mm反相氨基柱，粒径5μm。

1.4.2.2 柱温45℃，检测室40℃。

1.4.2.3 流动相：乙腈+水=76+24。

1.4.2.4 流量：1.5mL/min。

1.4.2.5 灵敏度：64。

1.4.2.6 进样量：20μL。

1.4.2.7 在上述色谱条件下注入标准溶液和试样溶液，以保留时间定性，外标法定量。

1.5 分析结果的表述

1.5.1 计算

1.5.1.1 试样中组分i的含量计算

$$X_i = \frac{C_i \times V}{1000 \times m} \times 100$$

式中：

X_i—试样中组分i（GF₂、GF₃、GF₄）的含量，g/100g；

C_i—根据回归方程计算试样中组分i（GF₂、GF₃、GF₄）的浓度，mg/mL；

V—试样的稀释体积，mL；

m—试样的质量，g。

1.5.1.2 试样中低聚果糖的含量计算：

$$FOS = X_{GF2} + X_{GF3} + X_{GF4}$$

式中：

FOS—试样中低聚果糖的含量，g/100g；

X_{GF2}—试样中GF₂的含量，g/100g；

X_{GF3}—试样中GF₃的含量，g/100g；

X_{GF4}—试样中GF₄的含量，g/100g。

1.5.2 结果表示：结果保留两位有效数字。

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】

净含量4.5g/袋，允许负偏差9%。

【原辅料质量要求】

- 1.低聚果糖：应符合GB/T 23528《低聚果糖》的规定。
- 2.羧甲基纤维素钠：应符合GB 1886.232《食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基纤维素钠》的规定。
- 3.麦香香精：应符合GB 30616《食品安全国家标准 食品用香精》的规定。
- 4.阿斯巴甜（含苯丙氨酸）：应符合GB 1886.47《食品安全国家标准 食品添加剂 天门冬酰苯丙氨酸甲酯（又名阿斯巴甜）》。
- 5.小麦麸膳食纤维

项 目	指 标			
来源	小麦（ ）加工过程中产生的小麦麸			
制法	经过筛、水解（50-60℃，pH 4.0-5.5，3h）、洗涤、离心、干燥（进风温度160-200℃，水分≤5.0%）、包装等主要工艺制成。			
感官要求	黄色至黄褐色不规则固体片状物，色泽基本均匀一致，具麦麸特有气味，无肉眼可见的杂质异物			
总膳食纤维，%	≥70.0			
水分，%	≤10.0			
灰分，%	≤2.0			
蛋白质，%	≤10.0			
粗脂肪，%	≤7.0			
铅（以Pb计），mg/kg	≤0.2			
镉（以Cd计），mg/kg	≤0.1			
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.02			
总砷（以As计），mg/kg	≤0.4			
铬（以Cr计），mg/kg	≤1.0			
苯并[a]芘，μg/kg	≤5.0			
黄曲霉毒素B ₁ ，μg/kg	≤5.0			
脱氧雪腐镰刀菌烯醇，μg/kg	≤1000			
赭曲霉毒素A，μg/kg	≤5.0			
玉米赤霉烯酮，μg/kg	≤60			
菌落总数，CFU/g	≤2000			
大肠菌群，MPN/100g	≤40			
霉菌和酵母，CFU/g	≤50			
	采样方案及限量（若非指定，均以/25g表示）			
	n	c	m	M
沙门氏菌	5	0	0	—
金黄色葡萄球菌	5	1	100CFU/g	1000CFU/g